



DISSOLUTION DES ADHÉSIONS

Plusieurs médecins ont tenté d'extraire les racines nerveuses de la queue de cheval de la masse inflammatoire et adhésive caractéristique de l'arachnoïdite adhésive. Différentes techniques chirurgicales, appelées thécoloscopie, ont été développées. Aucune n'a rencontré le succès escompté et seuls quelques chirurgiens pratiquent cette intervention. Malheureusement, cette procédure chirurgicale peut endommager davantage certaines racines nerveuses. En résumé: le traitement chirurgical de l'arachnoïdite adhésive est expérimental et nécessite une prise de risque.

Traitement pharmacologique: Il y a quelques années, des médecins français ont découvert qu'une association de pentoxifylline et de vitamine E favorisait la résorption de la fibrose épidurale. Cette affection, semblable à l'arachnoïdite adhésive, se caractérise par la présence d'une cicatrice fibreuse.

Nous avons connaissance de patients atteints d'arachnoïdite adhésive dont l'état s'est amélioré grâce au traitement suivant:

1. Pentoxifylline: 400 mg deux fois par jour
2. Vitamine E: 800 à 1 000 mg par jour

L'essai dure deux mois. Si vous vous sentez mieux, poursuivez le traitement.

Traitement à long terme: Très bien toléré. Poursuivez le traitement tant que vous en ressentez les bienfaits.

Comment ce traitement fonctionne: La pentoxifylline a un effet anti-inflammatoire et améliore la circulation sanguine. Grâce à une meilleure circulation, certains nerfs de la queue de cheval comprimés se libèrent, retrouvent leur intégrité et recommencent à transmettre des ondes bioélectriques.

Devez-vous essayer ce traitement? Oui, si vous gérez bien votre douleur et suivez un traitement antiinflammatoire.

Procédure expérimentale: Outre l'intervention chirurgicale mentionnée ci-dessus, certains médecins testent l'hyaluronidase et d'autres substances dissolvantes. Si l'une d'entre elles s'avère sûre et efficace, nous vous en informerons.