



LE PATCH DE FENTANYL:
UN EXCELLENT SOULAGEMENT DE LA DOULEUR DANS L'ARACHNOÏDITE ADHÉSIVE

Arachnoiditis Hope reçoit régulièrement des témoignages faisant état du soulagement exceptionnel de la douleur procuré par le patch de fentanyl. Nous recommandons vivement aux personnes atteintes d'AA qui ne sont pas satisfaites de leur traitement actuel de la douleur de discuter du patch de fentanyl avec leur médecin.

Traitement de première intention de la douleur*: Le traitement initial de la douleur liée à l'alopécie areata (AA) repose sur l'association d'un opioïde à faible dose et à courte durée d'action de ce groupe et d'un agent neuropathique:

Opioïdes de première intention: Tramadol, codéine, hydrocodone, buprénorphine ou oxycodone/acétaminophène

Agents neuropathiques: gabapentine, prégabaline (Lyrica®), duloxétine, diazépam, lorazépam, alprazolam, baclofène

*Dans le cadre d'un programme efficace de prise en charge de la douleur, nous recommandons désormais à toutes les personnes souffrant d'AA de prendre du palmitoylethanolamide (PEA) ou de la naltrexone à faible dose.

Avantages du timbre de fentanyl: Le timbre est disponible en dosages de 12, 25, 50 et 75 µg. Son action dure de 48 à 72 heures et procure un soulagement continu de la douleur pendant cette période.

Excellent bilan en matière d'absence d'abus, de surdosage et de détournement: Bien que le patch de fentanyl ait suscité des inquiétudes lors de sa mise sur le marché, les cas d'abus, de détournement ou de surdosage sont aujourd'hui quasi inexistantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les ordres des médecins et les organismes de réglementation le privilégient dans la plupart des cas.

Les médecins ne doivent pas hésiter à prescrire: Une personne atteinte d'AA (arachnoïdite) confirmée par IRM peut bénéficier d'opioïdes à tous les dosages et sous toutes leurs formes. Assurez-vous que votre dossier médical mentionne votre AA. Arachnoiditis Hope n'a connaissance d'aucun médecin ayant fait l'objet de mesures disciplinaires de la part de son ordre des médecins pour avoir prescrit des opioïdes à un patient atteint d'AA avérée. Veuillez informer votre médecin de cet excellent bilan.

En résumé: Les personnes atteintes d'AA ont besoin d'une bonne prise en charge de la douleur pour limiter l'inflammation et les réactions auto-immunes. Si votre traitement actuel de la douleur ne vous convient pas, envisagez un essai avec le patch de fentanyl.